



Блю Копер Нано® (Blue Copper Nano®)

**Допоможемо кожній рослині
отримати її мідь!**

Основним призначенням продукту є живлення й захист зернових, зернобобових, технічних, олійних, овочевих та плодово-ягідних культур з метою підвищення їх продуктивності, поліпшення якісних характеристик урожаю, показників зав'язі, стійкості до захворювань тощо.

Блю Копер Нано® це - унікальна формула у виді нано суспензії (розмір частинок активного інгредієнта менше 1 мікрометра), яка має наступні технологічні переваги в порівнянні з іншими препаратами та формуляціями:

- повне водорозчинення і безперешкодне засвоювання рослинами
- відмінна транспортабельність і проникнення в рослинну
- посилює стійкість рослин до грибкових та бактеріальних захворювань
- підвищує вміст білка та стимулює ріст і розвиток рослин
- підвищує активність ферментів, активізує білковий і фосфорний обмін
- посилює розвиток кореневої системи та підвищує посухостійкість рослин
- швидка дія та ефективність від застосування
- підвищує імунітет, життєздатність та стресостійкість рослин
- активізує ріст та розвиток рослини, пришвидшує їхнє дозрівання
- покращує стійкість до змивання дощем, утворює захисний шар
- застосовується з метою профілактики та ліквідації дефіциту міді

Механізм дії препарату

Блю Копер Нано® це унікальне контактне добриво з функцією фунгіциду на основі нано частин у формуляції, яка при мінімальних нормах

утворює захисний шар на рослині та повітропроникну плівку на поверхні, яку обприскують.

Створений препаратом шар плівки стабілізує діючу речовину на поверхні та затримує його на тривалий час. Таким чином, тривалість дії препарату довша у порівнянні з аналогічними продуктами інших виробників.

У **Блю Копер Нано®** за рахунок нано частинок концентрація активної міді (грам на літр) в декілька разів нижча в порівнянні з іншими мідьвмісними препаратами. Спори грибків та бактерій мають можливість легше та швидше поглинати дану мідь і тому руйнуються ефективніше. В результаті використання нано формуляції частинок активного інгредієнту, кількість міді, що використовується на гектар при застосуванні **Блю Копер Нано®** становить на 40-60% менше, ніж при використанні інших мідьвмісних препаратів, таким чином досягаючи збереження навколишнього середовища і зниження мідного навантаження на рослини.

Рекомендації з використання препарату **Блю Копер Нано® / Blue Copper Nano®**

Культура	Норма, л/га	Спосіб, час та максимальна кратність обробок проти вказаних захворювань рослин
Озима і Яра пшениця, ячмінь і ріпак	0,5 – 2,0 л / 1 т	Передпосівна обробка насіння і посадкового матеріалу
	0,5 – 4,0 л/га	Позакореневе підживлення в період вегетації, а також кореневе підживлення в період вегетації (завершальний обробіток щонайменше за 21 день до збирання). Дієвий проти захворювань: переноспороз, бактеріоз, плямистості, альтернаріоз, борошниста роса, септоріоз, іржа
Соняшник	0,5 – 4,0 л/га	Дворазове позакореневе і кореневе підживлення в період вегетації (завершальний обробіток можливий за 21 день до збирання) Дієвий проти захворювань: переноспороз, альтернаріоз
Соя	0,5 – 4,0 л/га	Дворазове позакореневе і кореневе підживлення в період вегетації (завершальний обробіток можливий за 21 день до збирання). Дієвий проти захворювань: переноспороз, бактеріоз, плямистості
Кісточкові фрукти	3,0 – 4,0 л/га (максимальна концентрація)	Після цвітіння, повторний обробіток в разі необхідності (максимум 4 обробітки), останній обробіток можливий за 10 днів до збирання.

	0,5%)	Дієвий проти захворювань: моніліоз, кокомікоз, клястероспоріоз, курчавість листя
Кісточково-плодові фрукти	3,0 – 4,0 л/га (максимальна концентрація 0,5%)	Після цвітіння, повторний обробіток в разі необхідності (максимум 4 обробітки), завершальний обробіток можливий за 21 день до збирання. Дієвий проти захворювань: парша, філlostиктоз (бура плямистість), бактеріальний опік
Ягоди: полуниця, малина, рози, смородина, ожина	3,0 – 4,0 л/га (максимальна концентрація 1,0%)	Полуниця – обробіток в проміжку між посадкою і цвітінням в разі необхідності 1-2 рази. Малина, рози, смородина – обробіток перед цвітінням в разі необхідності 1-2 рази. Дієвий проти захворювань: альтернаріоз, фітофтороз, бактеріоз, переноспороз борошниста роса
Виноград	3,0 – 4,0 л/га (максимальна концентрація 0,8%)	Від періоду закінчення цвітіння до озеленіння (в разі необхідності до 5 разів), завершальний обробіток можливий за 21 день до збирання. Дієвий проти захворювань: мілдью
Овочі: перець, томати, кавуни, огірки, гарбузи, квасоля, горох	3,0 – 4,0 л/га (максимальна концентрація 1,0%)	Після 2-х років після посіву і повторно в разі необхідності до 4-х разів (завершальний обробіток можливий за 7 днів до збирання). Дієвий проти захворювань: альтернаріоз, фітофтороз, бактеріоз
Цукровий буряк	3,0 – 4,0 л/га (максимальна концентрація 1,0%)	На протязі двох тижнів після появи паростків і повторення в разі необхідності максимум до 3-х разів (завершальний обробіток можливий за 21 день до збирання). Дієвий проти захворювань: церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз
Картопля	3,0 – 4,0 л/га (максимальна концентрація 1,0%)	На протязі двох тижнів після появи паростків і повторення в разі необхідності максимум до 3-х разів (завершальний обробіток можливий за 7 днів до збирання). Дієвий проти захворювань: альтернаріоз, фітофтороз

Діюча речовина, концентрація та формуляція:

сульфат міді триосновний, 350 г/л

Температурний режим зберігання: від +5 С° до +35 С°.**Гарантійний строк зберігання:** 3 роки.

Продукт потрібно зберігати у спеціалізованому сухому, прохолодному, добре вентильованому приміщенні за температури від +5 С° до +35 С° у герметично закритій непорушеній оригінальній упаковці.

Виробник: Agroterm Kft., 8182 Peremarton-gyartelep, Hungary**Ексклюзивний імпортер:** “Земельний Капітал”