



Блю Копер Нано®

Мідне мікродобриво з природним фунгіцидним ефектом, яке захистить та збільшить Ваш врожай

Діюча речовина, концентрація та формуляція: Сульфат міді три основний, 350 г/л нано суспензія. Сертифіковано для Органічного вирощування.

Основним призначенням продукту є живлення та фунгіцидний захист зернових, технічних, олійних, овочевих та плодово-ягідних культур з метою підвищення їх продуктивності та поліпшення кількісних і якісних характеристик урожаю.

02

Механізм дії препарату

Блю Копер Нано® це унікальне контактне добриво з функцією фунгіциду, на основі нано частин у формуляції, яке при мінімальних нормах утворює повітропроникну захисну плівку, яка стабілізує діючу речовину та утримує її на поверхні рослини тривалий час.

У Блю Копер Нано® за рахунок нано частинок концентрація активної міді (грам на літр) в декілька разів нижча в порівнянні з іншими препаратами, які містять мідь. Гриби та бактерії легше поглинають нано частини даної міді та гинуть швидше.

01

Блю Копер Нано® - це продукт

унікальна формула якого у виді нано суспензії (розмір частинок активного інгредієнта менший 1 мікрметра), який має наступні технологічні переваги в порівнянні з іншими препаратами:

- повне водо розчинення, відмінна транспортабельність і проникнення в рослину
- стимулює ріст і розвиток рослин, посилює розвиток кореневої системи
- підвищує імунітет, життєздатність та стійкість рослин до стресу
- підвищує посухостійкість рослин, пришвидшує їхнє дозрівання
- покращує стійкість до змивання дощем, утворює захисну плівку
- забезпечує стійкість та утримання діючої речовини на поверхні рослини
- пришвидшує період ліквідації дефіциту міді в рослині
- посилює стійкість рослин до грибкових та бактеріальних захворювань

В результаті використання нано формуляції частинок активного інгредієнту, кількість міді, що використовується на гектар при застосуванні Блю Копер Нано® становить на 40-60% менше, ніж при використанні інших препаратів, які містять мідь. Таким чином досягаючи зниження мідного навантаження на рослини.

Рекомендації з використання препарату Блю Копер Нано®

культура	Норма, л/га	Спосіб, час та максимальна кратність обробок
Озима і Яра пшениця, ячмінь і ріпак	0,5 – 2,0 л / 1 т	передпосівна обробка насіння і посадкового матеріалу
	0,5 – 4,0 л/га	позакореневе підживлення в період вегетації, а також кореневе підживлення в період вегетації (завершальний обробіток щонайменше за 21 день до збирання). Дієвий проти захворювань: переноспоров, бактеріоз, плямистості, альтернаріоз, борошниста роса, септоріоз, іржа
соняшник, соя	0,5 – 4,0 л/га	дворазове позакореневе і кореневе підживлення в період вегетації (завершальний обробіток можливий за 21 день до збирання). Дієвий проти захворювань: переноспоров, альтернаріоз бактеріоз, плямистості
цукровий буряк	0,5 – 4,0 л/га (max концен- трація 1,0%)	перше внесення у фазі 6-8 листіків культури повторення в разі необхідності максимум до 3-х разів (завершальний обробіток можливий за 21 день до збирання). Дієвий проти захворювань: церкоспоров, борошниста роса, переноспоров
картопля	0,5 – 4,0 л/га (max концен- трація 1,0%)	на протязі двох тижнів після появи паростків і повторення в разі необхідності максимум до 3-х разів (завершальний обробіток можливий за 7 днів до збирання). Дієвий проти захворювань: альтернаріоз, фітофтороз
кісточково- плодові фрукти	3,0 – 4,0 л/га (max концен- трація 0,5%)	після цвітіння, повторний обробіток в разі необхідності (максимум 4 обробітки), останній обробіток можливий за 10 днів до збирання. Дієвий проти захворювань: моніліоз, кокомікоз,клястероспоров, курчавість листя, парша, філlostиктоз (бура плямистість), бактеріальний опік
ягоди: полуниця, малина, рози, смородина ожина, лохина	3,0 – 4,0 л/га (max концен- трація 1,0%)	полуниця – обробіток в проміжку між посадкою і цвітінням в разі необхідності 1-2 рази. Малина, рози, смородина – обробіток перед цвітінням в разі необхідності 1-2 рази. Дієвий проти захворювань: альтернаріоз, фітофтороз, бактеріоз, переноспоров борошниста роса
Овочі: перець, томати, кавуни, огірки, гарбузи, квасоля,	0,5 – 4,0 л/га (max концен- трація 1,0%)	Перший обробіток у фазу 4-6 справжніх листків культури п повторно в разі необхідності до 3-х разів (завершальний обробіток можливий за 14 днів до збирання). Дієвий проти захворювань: альтернаріоз, фітофтороз, бактеріоз, переноспоров борошниста роса

ВИРОБНИК:
ІСПАНІЯ
ТАРА:
КАНІСТРА 5л та 20л

Приготування препарату
вказані на етикетці каністри.